

Infecções que o Responsável irá preencher na Notificação de retorno à Creche após receber o diagnóstico
(Para os Pais e/ou Responsável)

Nome da Infecção	Período de fácil contágio (※)	Orientações para o retorno à Creche
Infecção hemolítica estreptocócica 溶連菌感染症	Um dia antes e após a iniciação do tratamento com antibiotico adequado.	Ter se passado de 24 à 48 hrs após o tratamento antibiótico.
Pneumonia por micoplasma マイコプラズマ肺炎	Alguns dias antes e após a iniciação do tratamento antibiotico apropriado.	Ter parado as tosses fortes e estar sem febre.
Doença mão, pé e boca 手足口病	Durante os dias em que permanecer com sintomas de úlcera ou bolhas nas mãos, pés e cavidade oral.	Conseguir se alimentar bem sem ter influência de febre ou bolhas/úlceras orais.
Eritema Infeccioso (doença da maçã) 伝染性紅斑 (りんご病)	Uma semana antes do inicio da erupção cutânea.	Estar com o corpo todo em bom estado.
Gastroenterite viral (Norovírus, rotavirus, adenovirus, etc.) ウイルス性胃腸炎 (ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルス等)	Enquanto houver sintomas e 1 semana após ter desaparecido os sintomas. (Necessita de atenção, pois apesar de ter diminuído a carga de vírus, ocorre a descarga viral durante semanas.)	Conseguir se alimentar bem, após curar os sintomas de vomito e diarreia.
Herpangina ヘルパンギーナ	Durantes os dias do período agudo (Necessita de atenção, pois o vírus será expelido pelas fezes durante 1 mês).	Conseguir se alimentar bem sem ter influência de febre ou bolhas/úlceras orais.
Infecção por virus RS RSウイルス感染症	Enquanto houver sintomas respiratórios.	Quando estiver totalmente recuperado, sem sintomas respiratórios.
Cobreiro 帯状疱疹	Enquanto estiverem com bolhas formadas.	Quando estiver formado as crostas após a erupção cutânea.
Exantema súbito 突発性発疹	—	Quando estiver totalmente recuperado da febre e de bom humor.

※Os sinais negativos indicam infecções que não conseguimos definir exatamente qual o período de maior facilidade de contágio.