

Infecções de preenchimento do relatório médico
(Para os Pais e/ou Responsável)

Nome da Infecção	Período de fácil contágio (※)	Orientações para o retorno à Creche
Sarampo 麻疹 (はしか)	A partir de 1 dia antes ao início da infecção até 4 dias após a erupção cutânea.	Após 3 dias sem febre
Rubéola 風しん	A partir de 7 dias antes à erupção cutânea até 7 dias após.	Ter desaparecido a erupção cutânea.
Catapora 水痘 (水ぼうそう)	De 1 a 2 dias antes da erupção cutânea até se formar as crostas de sangue.	Ter se formado as crostas de sangue após a erupção cutânea.
Epidemia de caxumba 流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	A partir de 3 dias antes aos sintomas até 4 dias após a caxumba.	5 dias após ter desenvolvido o inchaço na glandula parótida, glandula submandibular ou/e glandula sublingual e estiver com o corpo totalmente recuperado.
Tuberculose 結核	—	Ter a certificação médica de não haver perigo de transmissão.
Febre laringoconjuntival 咽頭結膜熱 (プール熱)	Durante os dias que estiver com sintomas de hiperemia, febre, etc.	Ter passado 2 dias após desaparecer os sintomas de febre e hiperemia.
Ceratoconjuntivite epidêmica 流行性角結膜炎	Durante os dias que estiver com sintomas de Hiperemia, muco nos olhos, etc.	Ter desaparecido os sintomas da conjuntivite.
Coqueluche 百日咳	Caso não fizer o tratamento com antibiótico, 3 semanas após começar a tosse.	Após parar a tosse peculiar ou ter terminado o tratamento com preparação de substância antibacteriana de 5 dias.
Infecção enterohemorrágica Escherichia coli 腸管出血性大腸菌感染症 (O157、O26、O111, etc)	—	Ter a certificação médica de não haver perigo de transmissão. (No caso do paciente assintomático maior de 5 anos com hábitos de defecação estabelecidos, não há necessidade de deixar de comparecer à creche. No caso de menores de 5 anos, caso não sair bactérias nas fezes em duas vezes consecutivas, será possível ir à Creche.
Conjuntivite hemorrágica aguda 急性出血性結膜炎	—	Ter a certificação médica de não haver perigo de transmissão.
Meningite infecciosa de medula óssea 侵襲性髄膜炎菌感染症 (髄膜炎菌性髄膜炎)	—	Ter a certificação médica de não haver perigo de transmissão.

※Os sinais negativos indicam infecções que não conseguimos definir exatamente qual o período de maior facilidade de contágio.